

AANVRAAG IMMUNHEMATOLOGIE en BLOEDCOMPONENTEN

Identificatie Patiënt <p style="text-align: center;">Kleef hier een patiëntenetiket</p>	Afname datum:/...../..... afname uur::..... u Afname door: Dienst:
Identificatie & handtekening arts + datum	Klinische inlichtingen <input type="checkbox"/> Transplantpatiënt <input type="checkbox"/> Zwanger:weken <input type="checkbox"/> Andere:.....

Immuunhematologie

1 EDTA te voorzien van patiëntenetiket

- | labcode | Standaard testen |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ABORH | Bloedgroep ABO en rhesus |
| <input type="checkbox"/> RHFENK | Rhesusondergroepen (CcEe), incl Kell |
| <input type="checkbox"/> DATS | Directe antiglobulinetest (DAT / Dir. Coombs) |
| <input type="checkbox"/> OASS | Onregelmatige erythrocyten antistoffen (Indir. Coombs) |

- | Labcode | Speciale testen |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ANTAS | Anti-A (ext) |
| <input type="checkbox"/> ANTBS | Anti-B (ext) |
| <input type="checkbox"/> UBGTS | Uitgebreide bloedgroeytyping (enkel bij Tx en polytransfusies) (ext) |
| <input type="checkbox"/> ASTIS | Onregelmatige erythrocyten antistoffen titratie (igv zwangeren) (ext) |
| <input type="checkbox"/> KAGBTS | Koude agglutinenen (ext) |

Bloedproducten

1 EDTA te voorzien van patiëntenetiket

Geplande toediening:/...../..... omu.....

Afhaling: op labo
 Op bloedkast OK/IZ

Identificatie moeder (enkel igv neonat):

- Transfusie met indicatie voor polytransfusie en/of ernstig imuungecompromitteerde patiënt (honorarium medisch toezicht op hoog risico transfusie) (Labo testcode HON)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gedeleuk. Erythrocytenconcentraat (ECL)
Aantal:zakken | Indicatie (verplicht aan te duiden):
<input type="radio"/> Preoperatief
<input type="radio"/> Anemie
<input type="radio"/> Acut bloedverlies
<input type="radio"/> Andere | <input type="checkbox"/> Speciale behandeling: bestraald
Indicatie (verplicht aan te duiden):
<input type="radio"/> Prematuur
<input type="radio"/> Stamceltransplantatie patiënt
<input type="radio"/> Ernstige immuundeficiënties |
| <input type="checkbox"/> Gedeleuk. Erythrocytenconcentraat (EZL) zuigeling (< 3 maand)
Aantal:zakken | | |

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gedeleuk. Bloedplaatjesconcentraat (TS)
Aantal: zakken (met ong 6 à 8 N per zak)
1 N = 0.5*10 ¹¹ bloedplaatjes | Indicatie (verplicht aan te duiden):
<input type="radio"/> Therapeutisch bij hemorragie en trombocytopenie
<input type="radio"/> Profylactisch bij trombocytopenie
<input type="radio"/> Trombocytendefect, medicamenteus |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plasma (VPVIM)
Aantal:zakken | Indicatie (verplicht aan te duiden):
<input type="radio"/> Geïsoleerde tekorten aan stollingsfactor V of XI
<input type="radio"/> Onmiddellijke behandeling overdosis anti-vitamine K
<input type="radio"/> Trombotische trombocytopenische purpura (TTP, Moschowitz)
<input type="radio"/> Massaal bloedverlies met globaal deficit van alle stollingsfactoren. |
|---|---|

Voor speciale bloedcomponenten → zie achterzijde

Speciale Bloedproducten

Voor deze producten dient u vooraf contact op te nemen met het labo op nr. 3545 of 3642

Gedeleuk. Erythrocytenconcentraat (ECL)

Aantal:zakken

Indicatie (verplicht aan te duiden):

- Preoperatief
- Anemie
- Acuut bloedverlies
- Andere

Gereconstitueerd volbloed voor wisseltransfusie (ECL/VPVIM)

Aantal:zakken

Gedeleuk. erythrocytenconcentraat (ECL) autoloog

Aantal:zakken

Gedeleuk. erythrocytenconcentraat (ECL) gewassen

Aantal:zakken

Gedeleukocyteerd één-donor-bloedplaatjesconcentraat (TC)

Aantal:

Speciale behandeling: CMV negatief

Indicatie (verplicht aan te duiden):

- Onverwachte of haploidentieke verwante stamceltransplantatie waarbij zowel donor als patiënt CMV negatief zijn.

Speciale behandeling: bestraald

Indicatie (verplicht aan te duiden):

- Prematuur
- Stamceltransplantatie patiënt
- Ernstige immuundeficiënties

Indicaties (verplicht aan te duiden):

- IgA deficiëntie en IgA antistoffen
- Herhaaldelijke ernstige transfusiële reactie
- Pasgeborene met ernstige T-antigeen expressie

Indicatie (verplicht aan te duiden):

- HLA compatibel
- HPA compatibel